



## Merkblatt für Patienten zur stationären Aufnahme Station S 23

### Hals-Nasen-Ohrenklinik

Klinikdirektor

Prof. Dr. W. Heppt

Liebe Patientin, lieber Patient, bei Ihnen soll

\_\_\_\_\_ durchgeführt werden.

#### **Es wurde ein Termin vereinbart zur:**

vorstationären Untersuchung am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

Bitte kommen Sie **nicht nüchtern** (Sie dürfen vorher wie gewohnt essen und trinken).

Die Aufnahme findet in der HNO-Ambulanz in Zimmer S3.713 (Frau Stein) statt.

Terminvereinbarung und Terminänderung unter der Tel: 0721/974-2516 von 08.15 bis 13.45 Uhr

Aufgrund möglicher Wartezeiten, bitten wir Sie sich mit ausreichend **Essen und Trinken** im Voraus einzudecken.

**Am Voruntersuchungstag sind Sie bis ca. 15.00 Uhr in der HNO Klinik.**

stationären Aufnahme auf Station S23 (Tel: 0721/974-2521) am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr  
Bitte **bestätigen** Sie den Termin telefonisch **2 Wochen** vor der geplanten Aufnahmen unter 0721/974-2516

Bitte kommen Sie  **nüchtern** (nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen).

nicht nüchtern (Sie dürfen vorher wie gewohnt essen und trinken)

#### **Bitte bringen Sie folgende Befunde/Unterlagen mit:**

**✘ Liste der regelmäßig eingenommenen Medikamente**

**✘ Patientenverfügung/Betreuungsunterlagen (sofern vorhanden)**

- Röntgenbild der Lunge
- Röntgen-Breischluck
- CT (Computer-) / DVT (Volumentomogramm) der/des \_\_\_\_\_ einschl. Befundbericht
- MRT (Kernspintomogramm) der/des \_\_\_\_\_ einschl. Befundbericht
- Befundberichte über frühere Behandlungen, insbesondere \_\_\_\_\_
- EKG-Befund
- Folgende Blutwerte \_\_\_\_\_
- Krankenkassenkarte
- Einweisungsschein

Wenn Sie Medikamente zur **Blutverdünnung** oder **Schmerzmittel** einnehmen wie z. B.:

- **ASS** (z. B. **Aspirin, Godamed, Thomapyrin**),
- **andere moderne Blutgerinnungsmedikamente** (z.B. Plavix, Eliquis, Tiklid, Xarelto) oder
- **Marcumar**

muss individuell festgelegt werden ob diese vor der geplanten Operation abgesetzt oder auf andere Medikamente umgesetzt werden müssen. Dies wird entweder bei der ambulanten Voruntersuchung geklärt oder in Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt/Internisten, den Sie bitte aufsuchen.

Wenn Sie **Blutzuckertabletten** einnehmen,

gehen Sie bitte zu Ihrem Hausarzt/Internisten, da metforminhaltige Antidiabetika (z.B. Glucophage) 2 Tage vor einer geplanten Operation abgesetzt und ggf. ersetzt werden müssen.

Liegt bei Ihnen eine **vermehrte Blutungsneigung** vor, lassen Sie diese bitte durch Ihren Hausarzt/Internisten abklären.

Bitte teilen Sie uns eine (mögliche) Schwangerschaft mit.