

Städtisches Klinikum Karlsruhe

Städtisches Klinikum, Postfach 6280, 76042 Karlsruhe
Pathologisches Institut

Pathologisches Institut

Institutsdirektor
Prof. Dr. Thomas Rüdiger
Tel. 0721 974-1850 Fax -1859
thomas.ruediger@klinikum-karlsruhe.de

Chefarztsekretariat
Tel. 0721 974-1851 Fax -1859
iris.guenther@klinikum-karlsruhe.de

Behandlungsvertrag über das Erbringen Individueller Gesundheitsleistungen (IGeL)

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift

Der oben genannte Patient / die oben genannte Patientin wünscht die Durchführung der folgenden individuellen Gesundheitsleistung (IGeL) durch das behandelnde Pathologische Institut im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Im Rahmen der ärztlichen Behandlung werden in Ihrem konkreten Fall voraussichtlich folgende Gebühren gemäß GOÄ-Einfachsatz anfallen:

Zum Ankreuzen

☐ PIK3CA, PIK3R1, PTEN 2305,00 €

☐ PIK3CA (Hotspots) 486,44 €

Dem Patient/der Patientin ist bekannt, dass die genannten Leistungen nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung gehören und daher der genannte Betrag selbst zu tragen ist.

Unterschrift Patientin/Patient

Weiterhin bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich von der Ärztin / dem Arzt umfassend über den Nutzen der Individuellen Gesundheitsleistung aufgeklärt worden bin.

Ort, Datum

Unterschrift Patientin/Patient

Unterschrift Ärztin/Arzt

Weiterführende Informationen zur IGeL Leistung:

Die aktuelle Onkopedia Leitlinie [1] sieht bei der Erstdiagnose und zur Ausbreitungsdiagnostik (Staging) eines kolorektalen Karzinoms die Untersuchung auf Alterationen in den Genen *PIK3CA*, *PIK3R1* und *PTEN* vor, die bei ca. 35% der Pat. in den Stadien II und III des kolorektalen Karzinoms gefunden werden.

Patienten mit einer entsprechenden Alteration zeigten in der ALASCCA Studie eine signifikante Reduzierung des Rezidivrisikos durch die Einnahme von 160 mg ASS täglich über 3 Jahre, so dass die Gabe von ASS postoperativ für alle Pat. mit diesen Alterationen empfohlen wird [2].

[1] <https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/rektumkarzinom/@guideline/html/index.html>

[2] Martling A, Hed Myrberg I, Nilbert M et al; ALASCCA study group. Low-dose aspirin for PI3K-altered localized colorectal cancer. N Engl J Med 2025;393:1051-1064. DOI:10.1056/NEJMoa2504650