

Multiples Myelom

Multiples Myelom
Firstline, Phase 3
GMMG HD8
VRD + Isatuximab (i.v. vs. s.c.)
→ **Initiierung Q1/2024**

Legende:

- Studienname **ROT**: rekrutierend
- Studienname **GRÜN**: geplante Studien, Initiierung ausstehend
- * und hell hinterlegt: aktiv, Rekrutierung abgeschlossen

Lymphome

Diffus großzelliges B-NHL (DLBCL)

DLBCL > 80 J / > 60 J, 1L, ineligibel für int. Chemo; Phase 3
ARCHED
6x R-miniCHOP ± Acalabrutinib

DLBCL r/r, Phase 2
GOAL II
R-Gem/Ox ± Tafasitamab, Tafasitamab Konsolidierung

Primäres ZNS Lymphom > 70J/ 65-70J ineligibel für intensive Therapie für Jüngere; Phase 3
Prima CNS
6x R-MP ⇔ R-MTX/AraC + HCT-ASCT

CLL

CLL, 1L TP53mut/17p-/ kompl. Karyotyp, Phase 3
CLL16
Venetoclax/Obinutuzumab ± Acalabrutinib

Mantelzelllymphom (MCL)

MCL
Europäisches MCL
Register

Folikuläres Lymphom (FL)

Akute Leukämien

AML

AML/MDS EB2, alle (außer IDHmut/FLT3mut); 1L, Phase 3
AMLSG 31-19
Standard 7+3 ± Venetoclax (Restart 12/2023)

AML/MDS EB2, HD-ineligibel, 1L, Phase 3
AMLSG 32-21 (Decider2)
Decitabine + Venetoclax ± ATRA

AML intermediate/high risk; 1L, Phase 3
AMLSG 30-18
Standard 7+3 versus Vyxeos

AML/MDS EB2, FLT3mut, 1L
AMLSG 28-18*
Standard 7+3 ± Midostaurin/ Gilteritinib

AML/MDS EB2, IDHmut 1L, Phase 3
AMLSG 29-18
Standard 7+3 ± Ivosidenib/ Enasidenib (geschlossen)

High-risk AML/MDS in CR, AML im Rezidiv in CR Phase 3
GRAPPA
Standard Konditionierung mit ATG oder post-Tx Cyclophosphamid

ALL

BCR-ABL positive ALL < 55 J 1L, Phase 3
GMALL Evolve
Ponatinib ⇔ Imatinib + Chemo; Erhaltung allo ⇔ Ponatinib + Blinatumomab
→ Initiierung Q4/2023

ALL/LBL ≥ 18 Jahre, Phase 3
GMALL 08/13*

AML/MDS EB2, 1L
AMLSG Bio
Register

ALL/LBL, 1L
GMALL
Register

Geplante Studien 2024

Multiples Myelom
Firstline, Phase 3
GMMG HD9
Iberdomid vs Iberdomid + Isatuximab Erhaltung nach Therapie in GMMG HD8 Studie → Initiierung Q2-3/2024

MCL ED, nicht autoPBSCT & intensiv Chemotherapie fähig, Phase 2
MCL elderly III
Rituximab/Ibrutinib/Venetoclax ⇔ Ibrutinib/R-Bendamustin → Initiierung Q1/2024

FL St. III/IV oder II mit Bulk, Phase 3
M22-003
Rituximab/Revlimid (R²) ⇔ R² + Epcoritamab ⇔ CIT (R-/O- CHOP oder Bendamustin) → Initiierung Q1/2024

CLL alle Patienten
DCLLSG
Register

ALL/LBL ≥ 18 J ED, biphänotypische/sekundäre ALL, BCR::ABL negativ
GMALL 09/2023